

Datos del Producto

Número de Registro: 18939	Estado: <input checked="" type="checkbox"/> Vigente	Fechas	Inscripción: 17/01/1992	Renovación: 22/09/2015	Caducidad: 31/08/2026
Nombre Comercial: FOCUS ULTRA					

Titular	Fabricante
BASF ESPAÑOLA S.L.U. Can Rabia, 3-5 08017 Barcelona (Barcelona) ESPAÑA	BASF SE Carl-Bosch Str. 38 D-67056 Ludwigshafen (Rhein) ALEMANIA

Composición

CICLOXIDIM 10% [EC] P/V

Envases

- Envases de COEX PA/PE de tamaños: 0,15 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 3 l, 5 l y 10 l.
- Envases de HDPE-fluorado (HDPE/F) de tamaños: 0,15 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 3 l, 5 l y 10 l.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Ajo	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que la 5ª hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 5ª hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
Albaricoquero	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
Apio	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz (BBCH 13-45).
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz (BBCH 13-45).
Arroz	Gramíneas anuales	2 l/ha				Uso contra Oryza sp. Aplicar en presiembra del cultivo y en post-emergencia de las malas hierbas.
	Gramíneas plurianuales	4 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Aplicar en presiembra del cultivo y post-emergencia de las malas hierbas.
Berenjena	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta que 3er brote apical lateral primario este visible (BBCH12-23).
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta que 3er brote apical lateral primario este visible (BBCH12-23).

	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35)
Berza , col	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35)
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
Cebolla	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
Cebolleta	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
Chalote	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35)
Col de Bruselas	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35)
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado de cada variedad (BBCH 13-35).
Col de China	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado de cada variedad (BBCH 13-35).
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35)
Coliflor	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35)
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que hay tres hojas desplegadas hasta 9 o más nudos perceptibles (BBCH 13-35)
Colza	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que hay tres hojas desplegadas hasta 9 o más nudos perceptibles (BBCH 13-35)
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que la 3a hoja verdadera está desplegada hasta que la roseta está completamente desarrollada (BBCH 13-39)
Escarola	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 3a hoja verdadera está desplegada hasta que la roseta está completamente desarrollada (BBCH 13-39)
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que 9 hojas verdaderas están desplegadas (BBCH13-19)
Espinaca	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que 9 hojas verdaderas están desplegadas (BBCH13-19)
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que la tercera hoja verdadera está desplegada hasta 9 o más nudos alargados visiblemente (BBCH 13-35)
Garbanzo	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la tercera hoja verdadera está desplegada hasta 9 o más nudos alargados visiblemente (BBCH 13-35)
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que el primer par de hojas están desplegadas hasta 8 hojas desplegadas (BBCH 12-18)
Girasol	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que el primer par de hojas están desplegadas hasta 8 hojas desplegadas (BBCH 12-18)
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que se observen 2 hojas (con estípulas), desplegadas, o 2o zarcillo, desarrollado (en las variedades sin hojas) hasta 9 o más entrenudos, alargados visiblemente (BBCH12-39).
Guisante para grano	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que se observen 2 hojas (con estípulas), desplegadas, o 2o zarcillo, desarrollado (en las variedades sin hojas) hasta 9 o más entrenudos, alargados visiblemente (BBCH12-39).
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Uso en guisantes verdes con o sin vaina. Aplicar desde que se observen 2 hojas (con estípulas), desplegadas, o 2o zarcillo, desarrollado (en las variedades sin hojas) hasta 9 o más entrenudos, alargados visiblemente (BBCH12-39).

Guisante verde	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso en guisantes verdes con o sin vaina contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que se observen 2 hojas (con estípulas), desplegadas, o 2o zarcillo, desarrollado (en las variedades sin hojas) hasta 9 o más entrenudos, alargados visiblemente (BBCH12-39).
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que la tercera hoja verdadera está desplegada hasta 9 o más nudos alargados visiblemente (BBCH 13-35)
Haba para grano	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la tercera hoja verdadera está desplegada hasta 9 o más nudos alargados visiblemente (BBCH 13-35)
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Uso en habas verdes con y sin vaina. Aplicar desde 2 hojas enteras (1er. par de hojas), desplegadas hasta 9 o más brotes laterales, visibles (BBCH12-39).
Haba verde	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso en habas verdes con y sin vaina contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde 2 hojas enteras (1er. par de hojas), desplegadas hasta 9 o más brotes laterales, visibles (BBCH12-39).
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que se observen 2 hojas (con estípulas), desplegadas, o 2o zarcillo, desarrollado (en las variedades sin hojas) hasta 9 o más entrenudos, alargados visiblemente (BBCH12-39).
Judía para grano	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que se observen 2 hojas (con estípulas), desplegadas, o 2o zarcillo, desarrollado (en las variedades sin hojas) hasta 9 o más entrenudos, alargados visiblemente (BBCH12-39).
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Uso en judías verdes con y sin vaina. Aplicar desde 2 hojas enteras (1er. par de hojas), desplegadas hasta 9 o más brotes laterales, visibles (BBCH12-39).
Judía verde	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso en judías verdes con y sin vaina contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde 2 hojas enteras (1er. par de hojas), desplegadas hasta 9 o más brotes laterales, visibles (BBCH12-39).
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que la 3a hoja verdadera está desplegada hasta que la roseta está completamente desarrollada (BBCH 13-39)
Lechuga	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 3a hoja verdadera está desplegada hasta que la roseta está completamente desarrollada (BBCH 13-39)
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
Manzano	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
Melocotonero	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
Membrillero	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que las primeras hojas comienzan a alargarse hasta que 9 hojas del tallo principal estén desplegadas (BBCH 10-19)
Patata	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que las primeras hojas comienzan a alargarse hasta que 9 hojas del tallo principal estén desplegadas (BBCH 10-19)
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
Peral	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta que 3er brote apical primario este visible (BBCH12-23).
Pimiento	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta que 3er brote apical primario este visible (BBCH12-23).
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
Puerro	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que tres hojas están desplegadas hasta que la cobertura del cultivo ha finalizado: cerca del 90% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 13-39)
Remolacha azucarera	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que tres hojas están desplegadas hasta que la cobertura del cultivo ha finalizado: cerca del 90% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 13-39)
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que tres hojas están desplegadas hasta que la cobertura del cultivo ha finalizado: cerca del 90% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 13-39)

Remolacha forrajera	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que tres hojas están desplegadas hasta que la cobertura del cultivo ha finalizado: cerca del 90% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 13-39)
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35)
Repollo	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35)
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz (BBCH 13-45).
Salsifí	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz (BBCH 13-45).
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que hay una hoja trifoliar desplegada en el cuarto nudo hasta que haya una en el noveno nudo (BBCH 14-19)
Soja	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que hay una hoja trifoliar desplegada en el cuarto nudo hasta que haya una en el noveno nudo (BBCH 14-19)
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta que 3er brote apical lateral primario este visible (BBCH12-23).
Tomate	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta que 3er brote apical lateral primario este visible (BBCH12-23).
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta 9 hojas verdaderas o más desplegadas (BBCH 13-19).
Verdolaga	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta 9 hojas verdaderas o más desplegadas (BBCH 13-19).
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar hasta que todas las bayas del racimo se tocan (BBCH 79).
Vid	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que todas las bayas del racimo se tocan (BBCH 79).
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz (BBCH 13-45).
Zanahoria	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz (BBCH 13-45).

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO	P.S. (días)
Escarola, Lechuga, Pimiento	21
Albaricoquero, Apio, Cebolla, Coliflor, Espinaca, Haba verde, Judía verde, Manzano, Melocotonero, Membrillero, Peral, Repollo, Verdolaga	28
Guisante verde, Salsifí, Zanahoria	35
Ajo, Berenjena, Berza, col, Cebolleta, Chalote, Col de Bruselas, Col de China, Puerro, Tomate, Vid	42
Garbanzo, Guisante para grano, Haba para grano, Judía para grano, Patata, Soja	56
Arroz, Colza, Girasol, Remolacha azucarera, Remolacha forrajera	NP

Condiciones Generales de Uso



Herbicida de acción sistémica para el control de gramíneas anuales y plurianuales. Para uso profesional, en cultivos al aire libre, aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor o bien manual con mochila o lanza/pistola. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas). Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre. Tratar al atardecer ya que la luz descompone el producto así como, en terreno en tempero, siendo la temperatura óptima de 15-25 ° C para una mayor eficacia. Existe riesgo de desarrollo de resistencias. Para reducir el riesgo de aparición de resistencias, se recomienda:- Aplicación del producto siguiendo las indicaciones que figuran en la etiqueta.- Mezclar o secuenciar herbicidas con diferentes modos de acción.- Realizar métodos culturales, siempre que sea posible, para el manejo de malas hierbas.

Clase de Usuario

Uso profesional en lugares no destinados al público en general.
No se debe autorizar para los uso en jardinería exterior doméstica, ni para uso profesional en lugares destinados al público en general.



Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR

AIRE LIBRE:

• MEZCLA, CARGA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:

Para pulverizaciones manuales con mochila o lanza/pistola y pulverizaciones con tractor:

o ropa de trabajo
o guantes de protección química

• APLICACIÓN:

Mediante tractor: ropa de trabajo.
Mediante lanza/pistola y mochila: ropa de trabajo y guantes de protección química.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

o Ropa de trabajo: soja, patata, judías para grano, habas para grano, guisantes para grano, colza, girasol, remolacha azucarera, remolacha forrajera
o Ropa de trabajo y guantes de protección química: vid, cebolleta, puerro, tomate, coles de bruselas, col china, berza, berenjena, garbanzo, apio, zanahoria, guisante verde, lechuga, escarola, pimiento, espinacas, verdolaga, cebolla, chalota, salsifí, ajo, judías verdes, habas verdes, repollo, coliflor, manzano, peral, membrillo, melocotonero, nectarino, albaricoque (Los guantes de protección química están destinados a labores de reentrada relacionadas con el uso del herbicida para las malas hierbas tratadas)

FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo




No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química





Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	Irritación cutánea. Categoría 2. Irritación ocular. Categoría 2. Peligro por aspiración. Categoría 1. Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única). Categoría 3. Toxicidad para la reproducción (desarrollo), categoría 2
Pictograma	 GHS07 (signo de exclamación)  GHS08 (peligro para la salud)
Palabra de Advertencia	Peligro
Indicaciones de Peligro	EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. H315 -Provoca irritación cutánea. H319 -Provoca irritación ocular grave. H336 -Puede provocar somnolencia o vértigo. H304 -Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H361d -Se sospecha que daña al feto.
Consejos de Prudencia	P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua P305+P351+P338 -EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P301+P330+P331 -EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección. P201+P202 -Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático crónico 1
Pictograma	 GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.

Mitigación de riesgos ambientales



SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

Spe3: Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada.

Gestión de Envases



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).
 Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



Otras Indicaciones reglamentarias

Sp1: No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

En la etiqueta deberá indicarse que contiene Nafta disolvente del petróleo (CAS 64742-94-5). La Nafta disolvente del petróleo con nºCAS 64742-94-5 debe tener un contenido en naftaleno menor de 1%.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

No autorizado para jardinería exterior doméstica, ni en lugares destinados al público en general (aplicaciones profesionales).